

Z-PEN L.A



Antibiótico de amplio espectro
Suspensión inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Penicilina G Benzatínica.....	12.500.000 UI
Penicilina G Procaínica	12.500.000 UI
Penicilina G Potásica.....	5.000.000 UI
Dihidroestreptomocina Sulfato.....	25.000 mg
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: **Z PEN LA** es un antibiótico de amplio espectro. Indicado para el control y tratamiento de procesos infecciosos como: septicemias, mastitis, neumonías, panadizos, metritis, peritonitis, actinomicosis, leptospirosis, clostridiasis, castraciones, cicatrización de heridas y otras infecciones causadas por bacterias sensibles a las penicilinas y estreptomocina como: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus fecalis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Pasteurella* spp., *Campylobacter fetus*, *Brucella* spp., *Haemophilus* spp., *E. coli*, *Enterobacter aerogenes*, *Sallmonella* spp., *Shigella* spp., *Pseudomona aeruginosa*, *Leptospira* spp. etc.

DOSIS: 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso, una sola dosis. De ser necesario repetir a las 72 horas, máximo 5 días.

Bovinos: Más de 200 kg: 20 ml.

Equinos: Menos de 200 kg: 10 ml.

Porcinos y Ovinos: Adultos: 5 -8 ml.

Caninos y Felinos: Según el peso: 1-3 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Las penicilinas cruzan la placenta, y el uso seguro de estas drogas durante la gestación no se ha establecido con firmeza, pero no se han documentado problemas teratogénicos asociados con ellas; sin embargo, usar sólo cuando los posibles beneficios superen los riesgos.

Las penicilinas son excretadas en la leche materna en bajas concentraciones; su uso podría causar diarrea, candidiasis o respuestas alérgicas en las crías lactantes.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No se recomienda la combinación de la dihidroestreptomocina con otros agentes nefrotóxicos como polimixinas, tetraciclina, anfotericina B, cefaloridina, agentes mercuriales, analgésicos salicilatos y carbamazepina.

Las penicilinas pueden verse afectadas por metales pesados como cobre, mercurio, hierro y zinc los cuales alteran el anillo tiazolidina de su molécula.

Las penicilinas son antagonizadas por los grupos alcohólicos, tiol, cloranfenicol, eritromicina y tetraciclina.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida (a menos que no haya otras opciones).

ADVERTENCIAS: Realizar una prueba de sensibilidad cutánea previa a la aplicación. No aplicar junto con otro medicamento.

TIEMPO DE RETIRO: Leche y carne 30 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envase original; en un lugar fresco y seco, protegido de la luz a temperatura entre 2°C y 8°C. Una vez abierto manténgase en refrigeración .

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml.

Frasco x 20 ml.

Frasco x 50 ml.

Frasco 100 ml.

REGISTRO: 2B1-12249-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador